

# Gerje-Perje sík MTÉT


Teljes terület: 41 509 ha  
Támogatható terület: 36 166 ha  
Natura 2000 területek aránya: 52%

**Kapcsolat:**

Vincze Tibor

tel.: (30) 504-6559 Fax: (1) 200-1168

e-mail: delpest@dinpig.hu



Az igényelhető zonális agrár-környezet-gazdálkodási célprogramok:

	A/1 zóna		
	A/2 zóna		
	B zóna		
	C zóna		

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (1) Újszilvás     | (10) Nagykőrös    |
| (2) Abony         | (11) Nyársapát    |
| (3) Albertirsa    | (12) Pilis        |
| (4) Cegléd        | (13) Tószeg       |
| (5) Ceglédbercel  | (14) Törtel       |
| (6) Csemő         | (15) Tiszajenő    |
| (7) Jászkarajenő  | (16) Tiszakécske  |
| (8) Kőröstetétlen | (17) Tiszavárkony |
| (9) Kocsér        | (18) Tápiószőlős  |



Vidra Tamás – Szalakótás pusztai élőhely

A Gerje-Perje sík MTÉT a Duna-Tisza közti síkvidéken, Pest megye, Bács-Kiskun megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye találkozásánál helyezkedik el.

Kiterjedt gyepterületeivel, vízfelületeivel, idős magányos fáival, őshonos fajokból álló ligeteivel a Gerje-Perje sík kiemelt tájképi- és természetvédelmi értéket képvisel. Együtt találhatóak meg itt a Tiszántúlra jellemző nagy kiterjedésű szikes puszták és a Duna-Tisza-közé jellemző láprétek, homoki legelők, jól megőrizve az alföldre jellemző, legeltetéssel hasznosított pusztai élőhelyek mozaikját. A nagy kiterjedésű gyepek, legelők és kaszálók antropogén hatásra alakultak ki, és természeti állapotuk fenntartása továbbra is emberi beavatkozással lehetséges. A természetes gyeptípusok közül legnagyobb kiterjedésben mocsárrétek, és cikóros puszták fordulnak elő a területen, amelyek a termőhelyi viszonyok miatt igen sérülékenyek, könnyen gyomosodnak és degradálódnak. Ezen természetszerű élőhelyeken kívül kis kiterjedésben nádasok, zombéksásos állományok, ürmöspuszták, szikes rétek találhatóak az MTÉT határain belül.

Az MTÉT-et három nagyobb vízfolyás, a Gerje, a Perje és a Körös-ér érinti. A vízállásos területek kedvező élőhelyet nyújtanak a legtöbb kételtű faj számára. A terület szinte minden vízállásában nagy számban megtalálható a vöröshasú unka. Az ásóbéka a tavaszi vonulási időszakban többfelé látható, de a nyár derekára jellegzetesen nagyra nővő



Palatitz Péter – Kék vércse

**Az MTÉT elsődleges célja a mozaikos kultúrtáj megőrzése. A természeti értékek megóvásához, a gyepekhez kötődő védett fajok és az értékes madárvilág megőrzéséhez a környezeti szempontokkal összhangban működő mezőgazdálkodás szükséges.**



Vidra Tamás – Szártalan csüdfű

lárvai a legtöbb csatornában jelentős számban észlelhetők. A hullók sorában kiemelt jelentőségű a Natura 2000 jelölő faj mocsári teknős.

A térség legmagasabb térszínein, főleg a homokdombok platóin az egykori alföldi sztyepprétek maradványaiként főként zárt homokpusztaréteket, kisebb részben löszpusztagyepeket találunk.

A gerincesek fajokban leggazdagabb csoportját a madarak jelentik. Megfelelő vízviszonyok esetén mind a költő, mind a vonuló fajok nagy számban vannak jelen, közülük több faj is igen jelentős természetvédelmi értéket képvisel. A hamvas rétihéja, a kerecsensólyom, a kék vércse csak a legfontosabb fajok itt költő ragadozó madaraink közül, de a kanalas récétől kezdve a parlagi pityeren át, az ugartyúkig még számos faj tanúsítja a terület magas természetvédelmi értékét.

Mivel az egyes élőhelyek mozaikosan, szántókkal körbevéve helyezkednek el, azok jó ökológiai állapotban tartása csak a környezetükben megtalálható szántóterületek környezetbarát használatával érhető el. Sok helyen a mai napig láthatók a hagyományos gazdálkodás jellegzetességei – például extenzív állattartás, rétkaszálási rendszerek, kistáblás szántók – amelyek fennmaradása a faji és táji biodiverzitás megőrzése szempontjából elengedhetetlen.